

Impfplan 2022

adaptiert nach Bundesamt für Gesundheit*



Alter	Basis-Impfungen							Ergänzende Impfungen					
	Diphtherie	Tetanus ¹	Pertussis ²	Polio ³	Hib ⁴	Hepatitis B	Pneumokokken PCV13 ⁵	Masern, Mumps, Röteln	Varizellen ⁶	HPV Mädchen ⁷	Grippe	Meningokokken ACWY ⁸	HPV Jungen ⁷
2 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●						
4 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●						
9 Monate							●						
12 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●	●					
24 Monate					a		a	c			●		
4–7 Jahre	●	●	●	●	a		a	c				a	
11–14/15 Jahre	●	●	●	d		● ^b	c	● ^e	● ^h		● ⁱ	● ^h	
25 Jahre	● ^{f,g}	● ^{f,g}	● ^g	d		b	c	e	h	j		h	
45 Jahre	● ^{f,g}	● ^{f,g}	g	d		b	c			j			
Ab 65 Jahren	● ^{f,g}	● ^{f,g}	g	d		b				● ^j		● ^k	

● Kennzeichnet Einzel- oder Kombinationsimpfstoffe

¹ Tetanus = Starrkrampf; ² Pertussis = Keuchhusten; ³ Polio = Kinderlähmung;
⁴ Hib = *Haemophilus influenzae* Typ B; ⁵ PCV13: Pneumokokken, 13 Serotypen;
⁶ Varizellen = Windpocken/Wilde Blattern/Spitze Blattern; ⁷ HPV = Humane Papillomaviren;
⁸ Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y; ⁹ Herpes Zoster = Gürtelrose

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker.



- a Nachholimpfung bis 5. Geburtstag;
 - b Die Hepatitis B-Impfung wird bevorzugt für Säuglinge mit einem Kombinationsimpfstoff empfohlen. Die Hepatitis B-Impfung wird weiterhin für bisher nicht geimpfte Jugendliche im Alter von 11–15 Jahren empfohlen. Nachholimpfung in jedem Alter möglich (bei Expositionsrisiko).
 - c Nachholimpfung für alle nicht geimpften nach 1963 geborenen Personen;
 - d Nachholimpfung;
 - e Impfung bzw. Nachholimpfung für Varizellen für alle 11- bis 39-jährigen Personen, welche die Varizellen nicht durchgemacht haben;
 - f Auffrischimpfungen sind mit 25 (dTpa), 45 (dT) und 65 (dT) Jahren und danach alle 10 Jahre (dT) empfohlen. Kürzere Intervalle können je nach Risikosituation indiziert sein;
 - g Auffrischimpfung mit 25 Jahren; schwangere Frauen (jede Schwangerschaft)**; Kontakt mit Säuglingen < 6 Monaten**;
 - h Im Alter von 11–14 Jahren als Basisimpfung (Mädchen) und ergänzende Impfung (Jungen). Nachholimpfungen bis 26 Jahre gemäss Schweizerischem Impfplan;
 - i Nachholimpfung bis zum 20. Geburtstag;
 - j Schwangere Frauen (jede Schwangerschaft während Grippesaison)**; ab 65 Jahren (jährlich) als Basis-Impfung;
 - k Für immunkompetente Personen im Alter von ≥ 65 Jahren mit 2 Dosen (Zeitpunkte 0 und 2 Monate) mit dem adjuvantierten Subunit-Impfstoff.
- * Vereinfachte Darstellung der Angaben aus: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) Schweizerischer Impfplan 2022, 1–48. Richtlinien und Empfehlungen. Bern: Bundesamt für Gesundheit, 2022.
- ** Empfohlene Impfung der Kategorie Risikogruppen/Risikosituationen gemäss BAG Impfplan 2022. Für weitere Impfeempfehlungen dieser Kategorie sowie weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker.

Stempel der Arztpraxis oder Apotheke



GlaxoSmithKline AG
 Talstrasse 3–5
 3053 Münchenbuchsee