

# kleiner Pieks – grosse Wirkung



## Impfplan 2017

nach Bundesamt für Gesundheit



Alter	Basis-Impfungen	Ergänzende Impfungen
2 Monate	Diphtherie, Tetanus <sup>1</sup> , Pertussis <sup>2</sup> , Polio <sup>3</sup> , Hib <sup>4</sup> , Hepatitis B <sup>*</sup>	Pneumokokken
4 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatitis B <sup>*</sup>	Pneumokokken
6 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatitis B <sup>*</sup>	
12 Monate	Masern, Mumps, Röteln	Pneumokokken (Nachholimpfungen bis 5. Geb.)
12–15 Monate		Meningokokken C: 1. Dosis (Nachholimpfung bis 5. Geb.)
15–24 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatitis B <sup>*</sup> , Masern, Mumps, Röteln	
4–7 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Nachholimpfung Masern, Mumps, Röteln	
11–14 Jahre	HPV <sup>5</sup> ♀ (2 Dosen)	HPV <sup>5</sup> ♂ (2 Dosen)
11–15 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B <sup>**</sup> (2 od. 3 Dosen je nach Schema), Varizellen <sup>6</sup> (2 Dosen) Nachholimpfung Polio, Masern, Mumps, Röteln	Meningokokken C: 2. Dosis (Nachholimpfung bis 20. Geburtstag)
15–19 Jahre	Nachholimpfung HPV ♀ (3 Dosen)	Nachholimpfung HPV ♂ (3 Dosen)
25–29 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B <sup>**</sup>	Nachholimpfung HPV 20–26 Jahre ♀♂ (3 Dosen)
Erwachsene	Diphtherie, Tetanus (alle 20 Jahre, ab 65 Jahren alle 10 Jahre), Polio (Auffrischung vor Reisen in Polio-infizierte Länder), Nachholimpfung Masern, Mumps, Röteln <sup>o</sup> , Varizellen <sup>o</sup> , Hepatitis B <sup>**</sup> , Grippe ab 65 Jahren (jährlich)	



<sup>1</sup> Tetanus = Starrkrampf; <sup>2</sup> Pertussis = Keuchhusten; <sup>3</sup> Polio = Kinderlähmung; <sup>4</sup> Hib = *Haemophilus influenzae* Typ B;  
<sup>5</sup> HPV = Humane Papillomaviren; <sup>6</sup> Varizellen = Windpocken/Wilde Blättern/Spitze Blättern.

\* Hepatitis B-Impfung prioritär für Jugendliche im Alter von 11–15 Jahren empfohlen. Kann aber in jedem Alter verabreicht werden.  
Auch bei Säuglingen mit 6-fachem Impfstoff möglich.

\*\* Nachholimpfungen in jedem Alter ausser bei fehlendem Expositionsrisiko.

<sup>o</sup> Impfung bzw. Nachholimpfung für Varizellen für alle 11- bis 39-jährigen Personen, welche die Varizellen nicht durchgemacht haben.

# alle nicht geimpften (nicht immunen) nach 1963 geborenen Personen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/Ihre Ärztin.

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, CH-3053 Münchenbuchsee